

ITO STIM BARRIER

イトー スティムバリア

粘着パッドやテープから肌を守る
新発想の保湿・保護ジェル




伊藤超短波株式会社

スティムバリアは
粘着パッド、テープ類の使用時や
乾燥による皮膚トラブルに対して
お肌に潤いを与え、
バリア機能を高めます。



スティムバリアイメージ



〈乾燥肌〉

〈スティムバリア使用〉

こんな
シーンに

- ☒ 粘着パッドの使用時に
- ☒ テープ類の使用時に
- ☒ スポーツテーピングの使用時に
- ☒ 乾燥や荒れはじめのお肌に
- ☒ 普段のスキンケアに

主な用途

- お顔を含む全身の保湿として
- 手荒れやマスクかぶれの予防、ケアとして
- 粘着パッドやテープ、スポーツテーピングなどによる皮膚トラブルの予防として
- お肌に貼ったテープを剥がした後のアフターケアとして

使用上の注意

- ご使用後はキャップをきちんと閉めてください。
- 目に入った場合はすぐにぬるま湯か水で洗い流してください。
- 直射日光にあたる場所や、極端に高温・多湿の場所には置かないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。

配合成分

水、BG、グリセリン、エタノール、トウキ根エキス、シャクヤク根エキス、センキュウ根エキス、シオウ根エキス、コブチスチネンシス根エキス、シナキハダ樹皮エキス、オウゴン根エキス、クチナシ果実エキス、(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸 PEG-18) クロスポリマー、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリン Na) コポリマー、ポリソルベート60、スクワラン、ペンチレングリコール、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)) クロスポリマー、オキシベンゾン-4、キサンタンガム、アルギニン、加水分解コラーゲン、銀、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、水添レシチン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、1,2-ヘキサンジオール、トコフェロール

イトー スティムバリア〈顔・身体用ジェルクリーム〉 60g
メーカー希望小売価格 2,750円(税抜 2,500円)

発売元



伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

メディカル営業部

<https://www.medical.itolator.co.jp/>

営業所	札幌	TEL.011(820)2830	FAX.011(842)1562
	仙台	TEL.022(306)7667	FAX.022(306)7688
	埼玉	TEL.048(254)1013	FAX.048(254)1014
	東京	TEL.03(3812)1217	FAX.03(3814)4587
	横浜	TEL.045(949)0023	FAX.045(949)0025
	名古屋	TEL.052(701)4515	FAX.052(701)6905
	大阪	TEL.072(242)1043	FAX.072(242)1040
支店	広島	TEL.082(292)3330	FAX.082(292)3331
	福岡	TEL.092(573)6053	FAX.092(573)0218

製造販売元

グランメイト株式会社
GRANMATE

〒260-0007
千葉県千葉市中央区祐光4-2-1

お問い合わせ


注) このカタログに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

スティムバリア 3つの特徴

ITO STIM BARRIER

01 バリア膜による保護

温度感応性高分子クロスポリマーが、皮膚に薄いバリア膜を形成します。バリア膜があることで、お肌の水分が外に逃げないように潤いをキープします。また、テープなどを剥がす際の角質表皮剥離を軽減させます。




※(例) ツロブテロール貼付剤

※浸透は角質層をイメージしています

スティムバリアのバリア機能の秘密

水分を逃がさない

お肌の保護のためのバリア膜は2つの役割があります。1つ目は、**お肌の水分が外に逃げないように潤いをキープ**することです。スティムバリアには保湿成分も含まれますが、美容液やオイルを馴染ませたお肌にご使用いただくと、より保湿力が高まります。



(ジェル塗布前)



(ジェル塗布後)

お肌を守る

バリア膜の2つ目の役割は、**地に貼ったテープを剥がす際のダメージを軽減**することです。テープやスポーツテーピングを剥がす際に、お肌の表面が一緒に剥がれてしまうことで起こる「痛み」「かゆみ」「赤み」といったお悩みを軽減させます。また、テープの固定力を下げないのも特徴の1つです。

02 セラミドによる保湿

アミノ酸系セラミド類似物質を配合。皮膚の角質層の細胞間にあり、保湿の役割を果たす「セラミド」と同じ働きをする成分が保湿効果を高めます。アミノ酸系セラミドの働きとして〔角質柔軟化作用・バリア機能の向上・水分保持作用〕があります。




03 お肌に優しく、健やかに整える

無香料、無着色、パラベンフリー、弱酸性(pH6.2前後)で敏感肌の方でもお使いいただけます。**8種の混合植物エキスを配合**し肌荒れを防ぎながら、お肌のキメを整えます。



※イラストは小川香料株式会社様HPより転載

一般的なかゆみ止め塗布剤との引っぱり強度試験比較(健康人)




■引っぱり強度試験




※腎と透析69巻 別冊 アクセス2010 別冊
テープが剥がれない(室谷ら)

剥がしたテープについての角質細胞の比較(角質細胞の染色画像)

■ジェルなし(剥離 多い)



■ジェルあり(剥離 少なめ)



※第55回 日本透析医学会 発表
「新しく開発された高機能保湿ジェルの臨床評価」
(野木ら)

使用方法

- 1 粘着パッド、テープを使用する部位や乾燥しているお肌にスティムバリアを塗布します。

使用量の目安として真珠大(直径6mm程度・約0.5g)の量で、肘から手首までの内側一面に塗布できます。

- 2 スティムバリアを薄く延ばすようにお肌に馴染ませます。

- 3 約30秒でバリア膜が完成します。粘着パッドやテープを使用する際は、スティムバリアが乾いてから貼ってください。サラッとしているため、粘着パッドやテープの固定力を下げません。

粘着パッド、テープを剥がした後や日光を浴びたお肌のアフターケアにもお使いいただけます。



Q&A よくあるご質問

Q. 顔に塗っても大丈夫ですか？

A. お顔を含む全身の保湿として使用できます。微量なアルコールが含まれるため、目の粘膜などへのご使用はお控えください。

Q. テープを使用する際、いつ貼れば良いですか？ テープが剥がれやすくなりませんか？

A. スティムバリアをお肌に馴染ませるように薄く広げて約30秒ほどでバリア膜ができます。スティムバリアが乾いてからテープを貼ってください。テープの固定力を下げないのも特徴の1つです。(スティムバリアのバリア機能の秘密を参照)

Q. 貼り薬や粘着パッドを貼る前にも使用できますか？

A. どちらもご使用いただけます。水溶性の皮膜を網目状に形成するため、お薬も浸透します。また、通電も妨げないことも確認しております。

Q. アンダーラップやサポーターの下に塗っても大丈夫ですか？

A. バリア膜が汗の蒸散を抑制するため、テープに限らず、ムレ予防としてお使いいただけます。