

メディクスワブポビドンヨード

医療現場での安全・便利で確実な消毒に。

原寸大
4.5

十分に塗布できる薬液量 幅広い微生物に有効なポビドンヨード使用

小さな力で確実に薬液を押し出す「M字形状」(登録意匠)

薬液が飛び散るのを防ぐ、手を汚さない「ループ構造」(登録意匠)

綿棒を取り出しやすい「フィルムストップ加工」

中の綿棒を確認しやすい透明フィルム

medic swab
povidone iodine



メディクスワブ
ポビドンヨード 1.5



メディクスワブ
ポビドンヨード 1.5
2本入



メディクスワブ
ポビドンヨード 4.5

安心

一回使い切りタイプで、汚染リスクを最小限に

手軽

消毒剤の調整や、容器の洗浄・滅菌の手間をカット

明瞭

薬液の流れが確認できる透明容器を使用

高品質

専用設計した、薬液を塗布しやすい高品質の
日本製木軸綿棒を採用

衛生的

徹底した衛生管理のもと、クラス10000
(ISOクラス7)のクリーンブースで生産

便利

一本個包装で、在宅・訪問介護にも便利

使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

日本標準商品分類番号
872612

一般外用剤 第3類医薬品

メディクスワブポビドンヨード 1.5 メディクスワブポビドンヨード 4.5

(綿棒付き10%ポビドンヨード製剤)

メディクスワブポビドンヨード 1.5

承認番号: 21900APX00614000
承認年月: 2007年7月
販売開始: 2008年1月

メディクスワブポビドンヨード 4.5

承認番号: 21900APX00618000
承認年月: 2007年7月
販売開始: 2008年1月

【貯法】 直射日光を避け、室温保存

【使用期限】 箱ならびに製品に記載

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- きり傷、すりむき傷、さし傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒。
- とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒。

【用法・用量】 一日数回患部に塗布。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。
- (5) 外用にのみ使用すること。

【組成】

メディクスワブポビドンヨード1.5

担体	綿棒
有効成分	ポビドンヨード10w/v%
容量	綿棒1本あたり薬液 1.5mL

メディクスワブポビドンヨード4.5

担体	綿棒
有効成分	ポビドンヨード10w/v%
容量	綿棒1本あたり薬液 4.5mL

添加物: グリセリン、ラウロマクロゴール、クエン酸、リン酸水素ナトリウム

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光のあたらない、涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用の原因になったり品質が変わるため、他の容器に入れないこと。
- (4) 衣類等に付着したときは、水で洗い流すこと。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 綿に指が触れないように使用し、再使用はしないこと。
- (7) 薬液押し出し後又は開封後は、速やかに使用すること。
- (8) 薬液が漏れるおそれがあるため、薬液ポケットを下にして保管すること。

【取扱い方法】




本製品の薬液の押し出しを確実にするため、
次の手順でご使用ください。

- ① 薬液ポケットを押して
液を綿にしみこませる



- ② フィルムをめくり
綿棒を取り出す



薬液ポケットの押さえ方或使用環境(低温下など)によっては、力が加わりすぎてフィルムが破れるなどの原因となり、薬液が漏れ出すことがあります。

- 注1) 万が一、薬液ポケットから液が染み出ている場合は、ご使用を控えてください。
注2) フィルム特性により低温下ではきれいに剥がれないことがあります。

メディクスワブポビドンヨード
製品仕様

商品名	商品コード	綿棒規格	薬液量	製品サイズ(幅×奥行×高さ)	重量	JANコード
メディクスワブポビドンヨード 1.5	7004	全長: 約153mm 綿球径: 約10mm 1本/包	1.5mL	単品	125mm×110mm×255mm	210g
				外箱 (12箱入)	515mm×345mm×270mm	3.2kg
メディクスワブポビドンヨード 1.5 2本入	7010	全長: 約153mm 綿球径: 約10mm 2本/包	3.0mL	単品	125mm×110mm×255mm	300g
				外箱 (12箱入)	515mm×345mm×270mm	4.2kg
メディクスワブポビドンヨード 4.5	7003	全長: 約158mm 綿球径: 約14mm 1本/包	4.5mL	単品	135mm×110mm×255mm	320g
				外箱 (12箱入)	555mm×345mm×270mm	4.5kg
30包入 標準価格: 1,800円						4976558005346
30包入 標準価格: 2,400円						4976558005421
30包入 標準価格: 2,100円						4976558005353

【製造販売元】

平和メディック株式会社 <http://www.heiwamedic.com/>

〒506-0058 岐阜県高山市山田町1382番地6 TEL: 0120-380-512

受付時間 AM9:00~PM17:00(土・日・祝日を除く)

●本 社

〒506-0041 岐阜県高山市下切町180 TEL: 0577-33-0511 FAX: 0577-33-0819

●東京営業所

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-11 石川ビル202号 TEL: 03-3258-0966 FAX: 03-3258-0967

●大阪営業所

〒532-0011 大阪府淀川区西中島6-2-3 第7地産ビル505号 TEL: 06-6307-1666 FAX: 06-6307-7117

medic swab povidone iodine