



第2類医薬品

滅菌済

外用消毒剤

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿球

HAKUJUJI **ヘキシジン綿球**™

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液を綿球に含浸した、高圧蒸気滅菌済、殺菌・消毒用綿球です。
薬液調製や中材業務などの手間を省き、院内業務の省力化に最適です。



【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【成分】

PET※綿球1gあたり

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液10mL含浸(綿球1球あたり5.5mL含浸)

※PET:ポリエチレンテレフタレート

HAKUJUJI ヘキシジン綿球の特長

ポビドンヨードアレルギー患者様等の創傷部位の消毒に！

院内業務の省力化

・万能ツボの洗浄・滅菌、薬液と綿球の調整などが不要で、院内業務の省力化が可能です。

衛生的

・使い切りなので、消毒剤や綿球の継ぎ足し等の不衛生な管理がなく、容器使い回しによる汚染リスクを軽減できます。

※低水準消毒剤は微生物汚染を受ける可能性が高く、調整後、24時間以内に使いきることが推奨されています。

・高圧蒸気滅菌済

便利で経済的

・4隅のどこからでも開封可能で、開口部フィルム開封後、すぐ使用できて便利です。
また、適量の薬液量が含浸されておりますので、消毒剤や綿球の無駄な消費をなくすることができます。

※カップ素材には、PP(ポリプロピレン)を使用し、廃棄後焼却されてもダイオキシン類等の発生はほとんどなく環境面にも配慮しております。

消毒剤の使用濃度と適用範囲の例

薬剤名	使用濃度と適用範囲					
	濃度(当社製品名)	手指・皮膚	皮膚の創傷部位	粘膜の創傷部位	結膜囊	手術部位
イソプロパノール	70% (ワンショットプラス、ポケットコール等)	●				
消毒用エタノール	76.9～81.4% (ワンショットプラスEL-II、ワンショットプラスP EL-II等)	●				●
ポビドンヨード	10% (ポビ綿球、アブリスワブ等)		●	●		●
クロルヘキシジングルコン酸塩液	0.1～0.5% (ワンショットプラスヘキシジン0.2)	●				●
	0.05% (ヘキシジン綿球)		●			
	0.02% (アイ浄綿HP等)				●	
ベンザルコニウム塩化物液	0.01～0.025%		▲	●		
	0.01～0.05% (ハクジウ清浄綿AII等)				●	
	0.05～0.1%	▲				
	0.1～0.2%					▲


○：一般に使用 ▲：場合により使用

使用方法


※液ハネ注意!



1 上ぶたをめくって開封してください。
(4隅のどの位置からも開封可能です。)



2 ビンセット等を用いて綿球を取り出して
ください。



3 そのまま患部に塗布して用いてください。

■開封後はすみやかにご使用ください。

0.05%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸綿球

HAKUJUJI **ヘキシジン綿球**™

【特徴】

HAKUJUJIヘキシジン綿球は薬液を吸着しにくい綿球を使用し、外用消毒剤である0.05w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩液を併せて包装し、高圧蒸気滅菌処理をした製品です。薬液含浸済ですので、開封後そのまま使用できます。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の部位には使用しないこと

- ・ 眼、膀胱、口腔等の粘膜面
- ・ 広範囲の患部、深い傷やひどいやけど、ひどいただれ
- ・ 目のまわり

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本剤を1日数回、そのまま患部に塗布して用いる。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 外用にのみ使用すること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯でよく洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 石けん類や血清、膿汁等が付着していると、十分な効果が得られないことがあるので、十分に洗い流してから使用すること。
- (5) やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- (6) 一度個包装を開封したものは、無菌状態が保てないので、開封後は直ちに使い切ること。
- (7) 個包装が開封、破損や他の汚染が見られる場合は使用しないこと。

【成分・分量】

本剤は、下記の成分を含有する。

成 分	溶液100mL中の分量
日局 クロルヘキシジングルコン酸塩液 (20w/v%)	0.25mL (薬液として0.05w/v%)

薬液の担体としてPET綿球を含む。
PET綿球1gに対して薬液10mL含浸。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用や品質の低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えないこと。
- (4) 使用後は、トイレに流さないで、衛生的に処理すること。
- (5) 綿球、薬液等を継ぎ足して使用しないこと。
- (6) 本品は、小売りでの開封小分け販売はできない。

製造販売業者 **白十字株式会社**

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

お客様相談室 ☎ 0120-01-8910

受付時間/9:00～17:00(月～金 ※祝日を除く)

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱入数	JANコード	ITFコード
HAKUJUJI ヘキシジン綿球 No.20-2球 20個入	単品 135×145×110	344g	オープン 価格	12箱		梱 14987603106052
	梱 310×360×320	4.6kg				

●お問い合わせは

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

HJM-03