

哺乳びん・乳首・器具などの消毒に

ソークリン消毒液

次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%

daccoは助産師さんとママの声から生まれました

水位線が
見やすい
キャップ

持ちやすい
ホールディング

産科・婦人科製品

産科・婦人科製品

消毒液

消毒液

商品情報

■添付文書

販売名:ソークリン消毒液 次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%

⚠ 使用上の注意 (使用前に必ずお読みください。)

■相談すること

1. 本品は内服しないでください。また、あやまって飲み込んだ時は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。
2. 目に入らないよう注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
3. 本品の使用により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果、用法・用量	
効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒	哺乳びん・乳首を洗浄、水洗いした後、本剤の80倍液に1時間以上浸す。
医療器具の消毒	本剤の20～50倍液に数分間浸すか、拭拭する。
器具・物品などの消毒	本剤の20～50倍液に数分間浸すか、拭拭する。
室内・便所・浴室の消毒	本剤の20～50倍液で拭拭する。
排泄物の消毒	本剤の1～10倍液を用いる。

■用法及び用量に関連する注意

1. 定められた用法・用量を厳守してください。(排泄物の消毒時以外は、原液での使用を避けてください。また、熱湯での希釈は避けてください。)
2. 酸性の洗浄・漂白剤、シアヌル酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですので混合しないでください。
3. 金属製の容器又は製品(スプーン等)は、変質することがありますので、使用しないでください。化学繊維、皮革、毛、絹製品への使用も避けてください。
4. 調製後、消毒溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

⚠ まげな危険

酸性の洗浄・漂白剤、シアヌル酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですのでおやめください。

■成分・分量

次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%

■保管及び取扱上の注意

1. 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れかえないでください。
3. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので、注意してください。
4. 殺菌消毒する製品によっては印刷面、材質などを変色(変質)する場合がありますので注意してください。

製造販売元

シオエ製薬株式会社

兵庫県芦屋市瀬江3丁目1番11号

販売元

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市中区玉池町203番地

<お客様相談室> tel.0120-15-0039

(受付時間 10:00～17:00 土・日、祝日を除く)

<URL> http://www.osakimedical.co.jp

店舗専用

商品規格

商品写真 品番	商品名・内容量・規格	サイズ 幅×高さ×奥行(mm)	重量	個入数	POSレジ登録用品名略称 JANコード	JANコード/ITFコード
94580	ソークリン消毒液 次亜塩素酸Na1% 1100mL入	箱元単位 90 × 277 × 90 外装 280 × 290 × 190	1.2kg 7.6kg	6本	シ-クリン消毒薬ナトリウム1.0w/v% 4 971032 945804	4971032945804 14971032945801

■販売名:ソークリン消毒液 次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v% ■登録番号:23103AF900056000

< 商品名はすべてオープン価格です。 >

Osaki

オオサキメディカル株式会社

本社/名古屋市中区玉池町203番地 〒452-0812 Tel (052) 501-2221

ホームページ/ http://dacco-web.com E-mail/ support@osakimedical.co.jp

※添付文書が必ずお読みください。
※規格には影響が生じる場合があります。

取扱店

抵抗力・免疫力の弱いあかちゃんが口にする物は、 ソークリン消毒液でしっかり消毒&衛生的に!



ソークリンの由来
Soak + Clean
= 浸す + 清潔にする
So Clean! = とてもキレイ

Check!

次亜塩素酸ナトリウムを用いた 薬液消毒のメリット

浸すだけですすぎ不要

消毒溶液に浸すだけで消毒でき、取り出し後は、すすぎ不要です。
哺乳びん・乳首の消毒時は、1時間以上浸してください。

※ 次亜塩素酸ナトリウムは、ミルクなどの有機物によって分解し、塩化ナトリウムになります。

消毒溶液の交換は、1日1回を目安に
消毒溶液は、調製後、約24時間使用できます。




商品特長

① たっぷり容量で経済的!

- 内容量1100mLで、キャップの水位線約44杯分使えます。

② ホールドリングで持ちやすい

- ボトル上部の3本のホールドリングに指が引っかかるため、消毒液を注ぐ際に、片手で持ちやすくなっています。



③ キャップの水位線が見やすい

- ピンクの色付きキャップのため、消毒液を計量する際に、水位線が見やすくなっています。

水位線(25mL)



④ 調製しやすいキャップ容量

- キャップ内側の水位線25mLで、簡単に計量できます。
哺乳びん・乳首の消毒にはキャップ25mL(1杯)で消毒溶液2Lが調製できます。

⑤ お部屋の雰囲気にな馴染むパッケージ

- お部屋の雰囲気に馴染むシンプルで可愛いデザインです。




■ 使用対象(例)



※ 金属には使用しないでください。化学繊維・皮革・毛・絹製品への使用も避けてください。
※ 殺菌または殺虫剤へ使用する際は、必ず各メーカーの取扱説明書を参照してください。

■ 哺乳びん・乳首の消毒方法



■ 効能・効果、用法・用量

効能・効果	用法・用量	次亜塩素酸ナトリウム濃度(w/v%)
哺乳びん・乳首の消毒	哺乳びん・乳首を洗浄、水洗いした後、本剤の80倍液に1時間以上浸す。	0.0125
医療器具の消毒	本剤の20～50倍液に数分間浸すか、拭拭する。	0.02～0.05
器具・物品などの消毒	本剤の20～50倍液に数分間浸すか、拭拭する。	0.02～0.05
室内・便所・浴室の消毒	本剤の20～50倍液で拭拭する。	0.02～0.05
排泄物の消毒	本剤の1～10倍液を用いる。	0.1～1.0

■ 調製方法

次亜塩素酸ナトリウム濃度			希釈方法	
希釈倍率	w/v%	ppm	ソークリン消毒液	水(mL)
10倍	0.1	1000	25mL (キャップ内側の 水位線 1杯)	225
20倍	0.05	500		475
50倍	0.02	200		1225
80倍	0.0125	125		1975
				全量(mL)
				250
				500
				1250
				2000

※ 熱湯での希釈は避けてください。
※ 漂白剤・漂白剤・シアン酸の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですので混合しないでください。
※ 調製後、消毒溶液が変色した場合、その水での使用を避けてください。